



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

مرکز آموزش درمانی اعصاب و روان مهر

دانشتني هاي داروي کاربامازپين برای بیماران و همراهان

شناسنامه پروشور آموزشی

عنوان: دانشتني هاي داروي کاربامازپين
برای بیماران و همراهان

تهيه کننده: خديجه فرضي

سمت: سوپروايز آموزش به بیمار

تاييد کننده: کار گروه آموزش به بیمار

بازنگري: 1400/06/31

تدوين: 1399/11/01

منابع

(۱) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- معاونت
غذایی و دارویی- داروخانه رسمي ايران

(۲) راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران- دکتر
رامین خدام

آدرس: خرم آباد - کمالوند- روبروی کهریز- مجتمع
پرديس دانشگاه علوم پزشکی لرستان- بیمارستان

آموزش درمانی اعصاب و روان مهر

تلفن: ۰۶۶۳۳۴۱۳۰۸۳-۸۵

- در زمان مصرف دارو طبق توصیه های پزشک معالج خود در بازه های زمانی معین شده مراجعه کنید تا بررسی های لازم انجام شود و سطح داروی کاربامازپین سنجیده شود که دچار مسمومیت ناشی از آن نشوید.
- از مصرف دارو بعد از انقضا خودداری کنید و دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- دارو را کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگه داری کنید.



کاربامازپین

کاربامازپین در درمان تشنج و اختلالات خلقی کاربرد دارد برخی این دارو را با نام تگرتول می شناسند.

استفاده از این دارو در کوتاه نمودن دوره بیماری و کم کردن علائم و جلوگیری از حملات بعدی مؤثر می باشد و نباید زودتر از موعد مقرر و بدون نظر پزشک قطع شود.

اشکال دارویی:

به شکل قرص های ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم و شربت موجود است.

عوارض جانبی:

یبوست، سرگیجه خفیف، خواب آلودگی، گیجی، تهوع، استفراغ، سردرد، مشکل در به خواب رفتن، خشکی دهان و افزایش حساسیت به نور خورشید از عوارض جانبی کاربامازپین است.

توجه:

در صورت بروز خونریزی غیر معمول، یرقان، تیره شدن رنگ ادرار، مرفوع کم رنگ، درد شکمی، تب، لرز، گلو درد، کبود شدن بی دلیل پوست و زخم دهان و اختلال در هوشیاری و تعادل- (راش پوستی به همراه تب به همراه برجستگی غدد لنفاوی) سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

توجه:

جهت کاهش خشکی دهان می توان از آدامس ها و آب نیاتهای بدون قند استفاده نمود. به منظور کاهش پوسیدگی بهداشت دندان به طور مناسب رعایت شود.

تداخل دارویی:

مصرف همزمان کاربامازپین با وراپامیل، اریترومايسين باعث افزایش سطح خونی کاربامازپین می شود و ممکن است منجر به مسمومیت شود.

مصرف همزمان با الکل و داروهای خواب آور باعث افزایش اثر الکل و خواب آورها می شود.

مصرف همزمان کاربامازپین و سدیم والپروات بایستی با احتیاط و زیر نظر پزشک باشد.

در مصرف همزمان کاربامازپین و سایمتیدین اثر دارویی کاربامازپین افزایش می یابد و منجر به مسمومیت با کاربامازپین می شود.

مصرف کاربامازپین با داروهای ضد بارداری باعث کاهش اثر داروها ضد بارداری شده برای پیشگیری از بارداری از روشهای غیر هورمونی استفاده شود.

دارو باعث افزایش حساسیت به نور می شود در

طول درمان با کاربامازپین از قرار گرفتن طولانی مدت در برابر نور خورشید بپرهیزید و از کرم ضد آفتاب، عینک آفتابی و پوشش کامل استفاده نمایید.

- در صورت داشتن هر گونه مشکل کبدی و کلیوی قبل از مصرف دارو به پزشک اطلاع دهید.

- در صورت فراموش کردن یک دوز دارو از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری کنید.

- بدلیل ترشح کاربامازپین در شیر مادر در صورت استفاده از این دارو به پزشک خود اطلاع دهید.

- جهت جلوگیری از اختلالات گوارشی دارو را همراه با غذا و در فواصل زمانی مساوی مصرف کنید.

- از مصرف گریپ فروت در طول درمان با کاربامازپین بپرهیزید.

- مصرف داروی کاربامازپین ممکن است باعث خواب آلودگی سرگیجه و تاری دید شود در هفته اول درمان و در موارد افزایش مقدار مصرف از انجام فعالیتهای مانند رانندگی و کارهایی که نیازمند هوشیاری و دقت بالا می باشند خودداری کنید.

- دارو را طبق دستور پزشک معالج خود مصرف کنید و از قطع ناگهانی دارو بپرهیزید.